


Übungsblatt 12 zur Kommutativen Algebra



Aufgabe 1. (m+m+2+1+1) *Spiel und Spaß mit p-adischen Zahlen*

Sei \mathbb{Z}_p der Ring der p -adischen Ganzzahlen, konstruierbar als $\varprojlim_n \mathbb{Z}/(p^n)$ oder Vervollständigung von \mathbb{Z} bezüglich der (p) -adischen Topologie.

- Sei $f \in \mathbb{Z}[X]$ ein Polynom, das modulo p eine einfache Nullstelle besitzt. Zeige, dass f in \mathbb{Z}_p eine Nullstelle besitzt.
- Sei n eine zu p teilerfremde ganze Zahl. Zeige, dass n in \mathbb{Z}_p invertierbar ist.
- Berechne $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+p^n}$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^n}{1+p^n}$ in \mathbb{R} und in \mathbb{Z}_p .
- Seien x und y ganze Zahlen. Finde eine Folge p -adischer Zahlen, die in \mathbb{R} gegen x und in \mathbb{Z}_p gegen y konvergiert.
- Gibt es in \mathbb{Z}_{13} eine Quadratwurzel aus -1 ?

Aufgabe 2. (3+m+3+1) *Hensels Lemma*

Sei A ein Ring. Sei $f \in A[X]$ ein Polynom, das modulo einem Ideal \mathfrak{a} eine einfache Nullstelle besitzt: ein Element $x_1 \in A$ mit $f(x_1) \equiv 0$ modulo \mathfrak{a} , sodass es ein Element $y \in A$ mit $f'(x_1)y \equiv 1$ modulo \mathfrak{a} gibt. Wir definieren für $n \geq 1$: $x_{n+1} := x_n - yf(x_n)$.

- Zeige für alle $n \geq 1$, dass $x_n \equiv x_m \pmod{\mathfrak{a}^m}$ für alle $m < n$ und dass $f(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}^n}$.
- Zeige, dass $(x_n)_n$ eine Cauchy-Folge bezüglich der \mathfrak{a} -adischen Topologie ist.
- Sei A vollständig bezüglich dieser Topologie. Zeige, dass f eine Nullstelle in A besitzt.
- Unter welchem Namen ist das Konstruktionsverfahren für die x_n bekannt? Bewundere die Einheit der Mathematik.

Aufgabe 3. (2) *Regularität unter Vervollständigung*

Sei x ein reguläres Element in einem noetherschen Ring A . Sei \mathfrak{a} ein Ideal in A . Zeige, dass das Bild von x unter dem kanonischen Homomorphismus $A \rightarrow \hat{A}_{\mathfrak{a}}$ regulär ist.

Aufgabe 4. (m) *Potenzreihenentwicklung der Quadratwurzel*

Sei K ein Körper mit $2 \neq 0$. Zeige: Es gibt eine Potenzreihe $p \in K[[X]]$ mit $p^2 = 1 + X$.